

Male Circumcision

Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby's doctor will do it in the nursery. If your baby is small or has any medical problems, the circumcision may need to be done later. The doctor will have you sign a consent form before the circumcision is done.

During the Procedure

- The doctor will put a numbing medicine gel on the penis.
- Your baby may be offered a pacifier dipped in sugar water to ease pain.
- Your baby's legs will be held still while the foreskin is removed.
- Vaseline gauze may be placed around the end of the penis for the first 24 hours. This is to prevent the penis from sticking to the diaper.
- The procedure will last 5 to 10 minutes.

Your Baby

- Your baby may be fussy, not eat well or sleep more for the first 24 hours.
- Hold and comfort your baby.
- Redness, swelling and a small amount of bleeding may occur for the first 48 hours.
- As it heals, yellowish-white patches may appear. Do not try to wipe these off. The patches will go away as the circumcision heals.

Care After Circumcision

- Clean the penis gently with warm water each day. Pat dry.
- Watch for signs of infection such as redness, swelling or a foul odor.
- Put a small amount of petroleum jelly such as Vaseline at the end of the penis. Do this for 5-7 days each time you change the diaper.
- Your baby can take a tub bath after the circumcision is healed and the umbilical cord has fallen off.

남성 포경

남성 포경은 페니스 끝 부분의 포피를 제거하는 것입니다. 만약 귀하가 포경을 결정할 경우, 아기의 의사가 신생아실에서 수술을 할 것입니다. 만약 아기가 작거나 건강 문제가 있을 경우, 포경은 훗날에 해야 될수도 있습니다. 의사가 포경 전에 동의서에 서명하게 할 것입니다.

시술 절차

- 의사가 페니스를 마취하는 약을 바릅니다.
- 아기의 고통을 덜어주기 위해 설탕물에 담근 공갈 젓꼭지를 물려 줄수도 있습니다.
- 포피를 제거하는 동안 아기의 다리를 잡고 있을 것입니다.
- 첫 24 시간 동안은 바세린 가제를 페니스 끝 부분에 붙여 놓을 수도 있습니다. 페니스가 기저귀에 닿지 않도록 하기 위해서입니다.
- 시술에는 5분에서 10분 정도가 소요됩니다.

아기

- 첫 24 시간 동안 아기가 신경질적이거나 잘 먹지 않거나 잘 자지 않을 수 있습니다.
- 아기를 안아주고 편안하게 해주십시오.
- 첫 48 시간은 빨갱거나 붓거나 약간의 출혈이 있을 수도 있습니다.
- 좋아지면서 하얗고 노란 부분이 생길 수도 있습니다. 닦아내려고 하지 마십시오. 포경이 나아지면서 없어질 것입니다.

포경 후의 관리

- 매일 따뜻한 물로 페니스를 부드럽게 닦아주십시오. 부드럽게 두드려 말려 주십시오.
- 빨갱거나 붓거나 이상한 냄새 등 염증 증세를 관찰하십시오.
- 바세린과 같은 페트롤리움 젤리를 페니스 끝 부분에 약간 발라 주십시오. 5-7 일 동안 기저귀를 갈 때마다 바세린을 발라주십시오.
- 포경이 좋아지고 배꼽이 떨어진 후에 아기를 목욕시킬 수 있습니다.

Call Your Baby's Doctor if there is:

- A lot of bleeding or large areas of blood on the diaper
- Increased redness or swelling
- A foul odor
- No urine output within 12 hours of the circumcision

Talk to your baby's doctor if you have any questions or concerns.

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

다음 증상이 나타날 경우 의사에게 전화하십시오.

- 피가 많이 날 경우 또는 기저귀에 넓게 피가 묻어 있을 때
- 붉음 또는 붓기가 심할 때
- 이상한 냄새가 날 때
- 포경 후 12 시간안에 소변이 나오지 않을 때

질문 또는 우려사항이 있을 경우 의사와 상의하십시오.

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at www.healthinfotranslations.com.

Male Circumcision. Korean.