

# Male Circumcision

Male circumcision is the removal of the foreskin around the end of the penis. If you decide on circumcision, your baby's doctor will do it in the nursery. If your baby is small or has any medical problems, the circumcision may need to be done later. The doctor will have you sign a consent form before the circumcision is done.

## During the Procedure

- The doctor will put a numbing medicine gel on the penis.
- Your baby may be offered a pacifier dipped in sugar water to ease pain.
- Your baby's legs will be held still while the foreskin is removed.
- Vaseline gauze may be placed around the end of the penis for the first 24 hours. This is to prevent the penis from sticking to the diaper.
- The procedure will last 5 to 10 minutes.

## Your Baby

- Your baby may be fussy, not eat well or sleep more for the first 24 hours.
- Hold and comfort your baby.
- Redness, swelling and a small amount of bleeding may occur for the first 48 hours.
- As it heals, yellowish-white patches may appear. Do not try to wipe these off. The patches will go away as the circumcision heals.

## Care After Circumcision

- Clean the penis gently with warm water each day. Pat dry.
- Watch for signs of infection such as redness, swelling or a foul odor.
- Put a small amount of petroleum jelly such as Vaseline at the end of the penis. Do this for 5-7 days each time you change the diaper.
- Your baby can take a tub bath after the circumcision is healed and the umbilical cord has fallen off.

# Cắt Bao Quy Đầu cho Em Bé Trai

Cắt bao quy đầu cho em bé trai là cắt bỏ miếng da bao bọc ở đầu dương vật. Nếu quý vị muốn cắt bao quy đầu cho trẻ, bác sĩ của trẻ sẽ thực hiện thủ thuật này tại phòng trẻ sơ sinh. Nếu trẻ của quý vị nhỏ quá hay có vấn đề về sức khỏe, thì có thể được cắt bao quy đầu sau này. Bác sĩ sẽ cho quý vị ký vào giấy đồng ý trước khi làm thủ thuật cắt bao quy đầu.

## Trong thời gian làm thủ thuật

- Bác sĩ sẽ thoa một loại thuốc tê lên dương vật.
- Trẻ có thể được cho ngậm một núm vú giả ngậm trong nước đường để làm giảm cơn đau.
- Hai chân của trẻ sẽ được giữ chặt trong khi cắt bao quy đầu.
- Bác sĩ sẽ bôi vaseline quanh quy đầu trong 24 giờ đầu, để cho dương vật không dính vào tã lót.
- Thời gian làm thủ thuật kéo dài từ 5 đến 10 phút.

## Trẻ của quý vị

- Trẻ của quý vị có thể càu nhàu, không bú tốt hay ngủ nhiều trong 24 giờ đầu.
- Quý vị nên bế trẻ và làm cho em thoải mái.
- Trẻ có thể bị nổi đỏ, sưng lên và chảy ít máu chút ít trong 48 giờ đầu.
- Trong lúc vết cắt lành lại, thì có thể có những đốm hơi vàng-trắng xuất hiện. Đừng chùi bỏ chúng. Các đốm sẽ mất đi khi vết cắt bao quy đầu lành dần.

## Chăm sóc sau khi làm thủ thuật

- Rửa dương vật nhẹ nhàng với nước ấm mỗi ngày. Chạm khô nhẹ nhàng.
- Lưu ý đến các dấu hiệu bị nhiễm trùng như mẩn đỏ, sưng lên hay có mùi hôi.
- Bôi một tí dầu bôi trơn như vaseline vào đầu dương vật. Làm như vậy trong 5-7 ngày mỗi lần thay tã lót cho trẻ.
- Quý vị có thể tắm bồn trẻ sau khi quy đầu lành hẳn và dây rốn rụng.

**Call Your Baby's Doctor if there is:**

- A lot of bleeding or large areas of blood on the diaper
- Increased redness or swelling
- A foul odor
- No urine output within 12 hours of the circumcision

**Talk to your baby's doctor if you have any questions or concerns.**

**Gọi cho bác sĩ của trẻ nếu có các dấu hiệu sau:**

- Có nhiều máu hay có máu loang một vùng rộng trên tã lót
- Mẩn đỏ nhiều hay sưng to hơn
- Có mùi hôi
- Trẻ không có nước tiểu trong vòng 12 giờ đồng hồ sau khi cắt bao quy đầu

**Bàn với bác sĩ của trẻ nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào.**

2/2007. Developed through a partnership of Mount Carmel Health, Ohio State University Medical Center, and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).

Male Circumcision. Vietnamese.