

# Nitroglycerin

Nitroglycerin is a medicine used to treat chest pain called angina. Take nitroglycerin as directed by your doctor.

- If you are pregnant or breastfeeding, **talk to your doctor** before using this medicine.
- Always keep your nitroglycerin with you.
- This medicine may make you dizzy or lightheaded when you stand up or get out of bed. Get up slowly from a sitting or lying position.
- Avoid alcohol while using nitroglycerin.
- Keep nitroglycerin in its original bottle to keep its strength. The medicine should cause a sting or a tingle under your tongue.
- Keep the medicine out of the reach of children.

## **If you use tablets:**

1. Sit down and rest 2-3 minutes.
2. If you have chest pain or discomfort that is not better with rest, place 1 tablet under your tongue. Do not swallow the tablet.
3. If you still have chest pain after 5 minutes, put a second tablet under your tongue.
4. If the chest pain does not go away after another 5 minutes, use a third tablet. You may take up to 3 tablets in 15 minutes.
5. If you still have pain, **call 911**. Do not drive yourself to the hospital because you may be having a heart attack.

## **If you use spray:**

1. Sit down and rest for 2-3 minutes.
2. If you have chest pain or discomfort that is not better with rest, hold the can up with the spray button on top as close to your mouth as you can.
3. Press down on the button and spray the medicine onto your tongue or under it. Don't swallow right away. Wait 10 seconds.
4. If your chest pain lasts longer than 5 minutes, spray a second dose into your mouth.
5. If the chest pain does not go away after another 5 minutes, spray a third dose. You may use up to 3 sprays in 15 minutes.
6. If you still have pain, **call 911**. Do not drive yourself to the hospital because you may be having a heart attack.

# Нітрогліцерин

Нітрогліцерин - це ліки, що використовуються для лікування болю в грудях, що називається стенокардією. Приймайте нітрогліцерин відповідно до призначення лікаря.

- Якщо Ви вагітні або годуєте грудьми, перед прийомом цих ліків **порадьтеся із своїм лікарем.**
- Завжди носіть нітрогліцерин із собою.
- Ці ліки можуть спричинити запаморочення при вставанні або при підйомі з ліжка. Повільно вставайте із сидячого або лежачого положення.
- При застосуванні нітрогліцерину уникайте вживання алкоголю.
- Зберігайте нітрогліцерин в оригінальній пляшці, щоб він не втратив своїх властивостей. Ці ліки повинні викликати печіння або пощипування під язиком.
- Зберігайте ліки в недосяжному для дітей місці.

## Якщо Ви приймаєте таблетки:

1. Сядьте і відпочиньте протягом 2-3 хвилин.
2. Якщо у Вас біль або дискомфорт в грудях, що не проходить після відпочинку, покладіть 1 таблетку під язик. Не ковтайте таблетку.
3. Якщо через 5 хвилин біль у грудях не проходить, покладіть під язик другу таблетку.
4. Якщо ще через 5 хвилин біль у грудях не проходить, використайте третю таблетку. Ви можете прийняти до 3 таблеток протягом 15 хвилин.
5. Якщо біль не проходить, **зателефонуйте 911**. Не сідайте за кермо, для того щоб доїхати до лікарні, тому що у Вас може бути серцевий напад.

## Якщо Ви приймаєте аерозоль:

1. Сядьте й відпочиньте протягом 2-3 хвилин.
2. Якщо у Вас біль або дискомфорт у грудях, які не проходять після відпочинку, піднесіть балон з розприскувачем зверху якнайближче до рота.
3. Натисніть на кришку і направте струмінь із ліками на язик або під язик. Не ковтайте відразу. Почекайте 10 секунд.
4. Якщо біль у грудях триває більше 5 хвилин, прийміть другу дозу.
5. Якщо ще через 5 хвилин біль у грудях не проходить, прийміть третю дозу. Ви можете прийняти до 3 доз протягом 15 хвилин.
6. Якщо біль не проходить, **зателефонуйте 911**. Не сідайте за кермо, для того щоб доїхати до лікарні, тому що у Вас може бути серцевий напад.

Call your doctor **right away** if you have any of these side effects:

- Blurred vision
- Trouble breathing
- Fainting, dizziness or severe weakness
- Flushed or hot face
- Fast heartbeat
- Headache
- Nausea

**Talk to your doctor, nurse or pharmacist if you have any questions or concerns about taking nitroglycerin.**

**Негайно** зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас є будь-який з цих побічних симптомів:

- Затуманений зір
- Утруднений подих
- Непритомність, запаморочення або сильна слабкість
- Почервоніння або приплив крові до обличчя
- Прискорене серцебиття
- Головний біль
- Нудота

**Якщо у Вас є які-небудь питання або побоювання, пов'язані з прийомом нітрогліцерину, зверніться до Вашого лікаря, медсестри або аптекаря.**

Nitroglycerin. Ukrainian.

7/2005. Developed through a partnership of The Ohio State University Medical Center, Mount Carmel Health and OhioHealth, Columbus, Ohio. Available for use as a public service without copyright restrictions at [www.healthinfotranslations.com](http://www.healthinfotranslations.com).